

Effettuare una ricerca è un dovere!

Mantenere la calma.

Se la selvaggina non muore subito, ricaricare immediatamente l'arma e sparare un secondo colpo per finire l'animale.

Attendere almeno mezz'ora prima di recarsi sul luogo d'impatto della pallottola.

Non inseguire la selvaggina colpita.

Battute alla selvaggina ferita sono assolutamente da evitare.

Ciò aumenta la possibilità di abbattere velocemente la selvaggina ferita e di concludere con successo la ricerca.

Comportamento corretto dopo lo sparo

Dopo lo sparo il cacciatore/caciatrice deve osservare attentamente il comportamento e la via di fuga dell'animale. Se la selvaggina non stramazza sul posto si deve intraprendere un'accurata ricerca.

Il cacciatore deve segnalare in modo chiaro ed evidente la propria posizione e quella in cui si trovava l'animale.

Giunto sul luogo d'impatto della pallottola, vanno cercate accuratamente eventuali tracce del colpo. Se dagli effetti del colpo si deduce sia improbabile un possibile ritrovamento dell'animale, è necessario richiedere l'intervento di un cane da traccia.

Le ricerche di selvaggina ferita possono essere intraprese con i nostri cani abilitati e autorizzati dall'Ufficio della Caccia e della Pesca.

La ricerca dell'ungulato ferito deve essere annunciata all'UCP o ad un guardiacaccia.

Il conduttore del cane da traccia dirige le operazioni di ricerca, a lui spetta il diritto d'interruzione della ricerca.

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e "VIVA LA CACCIA"

Editore: 2015, CTCT, Mezzovico in collaborazione con il BSC, Club grigionese dei conduttori dei cani da sangue, CGCCS.
Fotografia in prima pagina: Sep Antona Bergamin, Cunter



Repubblica e Cantone Ticino
Ufficio della caccia e della pesca

Prima della caccia:

Provare il fucile.

Prima di sparare:

Valutare la selvaggina in modo corretto;

Tenere conto della distanza;

Considerare le condizioni meteorologiche (luce, vento, ecc.);

Considerare la posizione dell'animale.

Dopo lo sparo:

Le tracce rinvenute (pelo, sangue, pezzi di carne, ecc.) vanno ricoperte bene e marcate in modo che possano essere ritrovate in qualsiasi momento.




www.ctct.ch


Reazione al colpo da parte della selvaggina colpita

Come reagisce la selvaggina al colpo?

A: Colpo ai reni: brusco cedimento (inarcamento) del treno posteriore. Sofferenza prolungata. Di regola il sangue viene trovato solamente sul luogo dell'impatto in quanto fluisce all'interno.




B: Colpo alle interiora: se colpito da fermo, l'animale scalcia con le gambe posteriori. Gli animali in fuga difficilmente manifestano una reazione.




C: Colpo alle estremità anteriori: l'estremità colpita cede brevemente, l'animale fugge penzolando l'arto. Nel caso di ferimento della parte bassa dell'arto (sopra lo zoccolo), solamente un attento controllo del luogo d'impatto permette di rilevare se e dove è stato colpito l'animale.



D: Colpo al fegato o alla pancia: l'animale si contrae. Gli animali fermi lo segnalano in maniera più evidente. La selvaggina, soprattutto il capriolo, cerca immediatamente riparo.



E: Colpo alle estremità posteriori: vedi C.



F: Colpo alla parte superiore della spina dorsale (apofisi vertebrale): l'animale crolla all'istante ma dopo breve tempo si rialza e fugge. Ricaricare subito l'arma per abbattere l'animale. Normalmente si trovano poche tracce sul luogo dell'impatto della pallottola.



CTCT - Cani da Traccia Canton Ticino
No. tel. centralino per il recupero della selvaggina: 079/882.42.22